


Nobivac® Respira Bb



SUBUNIT-IMPfstoff

Basierend auf Fimbrien-Antigen



1 JAHR SCHUTZ

Bei Vorimpfung mit Nobivac® BbPi oder nach Wiederholungsimpfung mit Nobivac® Respira Bb



EINFACHE HANDHABUNG

Gebrauchsfertig und zeitsparend



NACHGEWIESENE SICHERHEIT

Auch bei kleinen Hunderassen³

Weitere Produktinformationen finden Sie hier:



Nobivac® Respira Bb
verschreibungspflichtig



JETZT
5 x 1 Fertigspritzen

155026.DE.AT.August2023(2.000) - DE-NOV-230700002

Nobivac®
Protection unites us.

HUSTENFREI DURCHSCHLAFEN

Impfen gegen
Bordetella bronchiseptica (Bb)



Nobivac® Respira Bb

JETZT in der praktischen Fertigspritze



1 Schulz et al.: Detection of respiratory viruses and Bordetella bronchiseptica in dogs with acute respiratory tract infections, The Veterinary Journal 201, 2014 2 MSD Interne Studie 0031-16 3 Interne Studie Nobivac® Respira Bb S15007

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet Deutschland GmbH · Feldstraße 1a · D-85716 Unterschleißheim · www.msd-tiergesundheit.de
Intervet GesmbH · Siemensstraße 107 · A-1210 Wien · www.msd-tiergesundheit.at

 **MSD**
Tiergesundheit

MEHR. WERT.
PRÄVENTION.

 **MSD**
Tiergesundheit

Haupterreger CIRD
**BORDETELLA
 BRONCHISEPTICA**

78,7%

B. bronchiseptica ist in 78,7 % der Patienten mit akuten respiratorischen Symptomen der primär beteiligte Erreger


B. bronchiseptica ist mehr als doppelt so häufig der Auslöser für akute respiratorische Erkrankungen als das **canine Parainfluenzavirus**¹

STARKER SCHUTZ
 vor klinischen Symptomen

Schutzwirkung

nach Belastungsinfektion mit *Bordetella bronchiseptica* zwei Wochen nach Grundimmunisierung.²

Signifikant weniger klinische Anzeichen von Atemwegserkrankungen



Bewertung klinischer Symptome (Gruppen-Mittelwert)

■ Ungeimpfte Kontrolle ■ Nobivac® Respira Bb

Weitgehende Vermeidung von Husten



Bewertung des Auftretens von Husten (Gruppen-Mittelwert)

NOBIVAC® HUSTENIMPFFSTOFFE
 Flexibilität für Sie, Hund und Halter

Mit Nobivac® schützen Sie Hunde aller Größen vor Husten.

Nicht abgebildet: die jährliche intranasale Nobivac® BbPi Impfung. Die Kreise im Impfschema entsprechen den Farben der Fläschchenkappen.

	1. IMPFUNG	2. IMPFUNG (-4 Wochen später)	ERSTER JÄHRLICHER BOOSTER ^A	2. JAHR	3. JAHR	4. JAHR	5. JAHR
Nobivac® SHP	○	○	○			○	
Nobivac® SHPi	○	○	○			○	
Nobivac® L4	○	○	○	○	○	○	○
Nobivac® Pi				○	○		○
Nobivac® BbPi	○ ^B		○	○	○	○	○
Nobivac® Respira Bb							

	1. IMPFUNG	2. IMPFUNG (-4 Wochen später)	ERSTER BOOSTER ^A	2. JAHR	3. JAHR	4. JAHR	5. JAHR
Nobivac® SHPi	○	○	○ (12 Monate später)			○	
Nobivac® L4	○	○	○ (12 Monate später)	○	○	○	○
Nobivac® Pi				○	○		○
Nobivac® Respira Bb	○ ^C	○	○ (7-12 Monate später)	○	○	○	○

IMPFSHEMA 1

Vorimpfung mit Nobivac® BbPi, dann Wechsel zu Nobivac® Respira Bb

A Der erste jährliche Booster nach weiteren 12 Monaten für S,H und P wird national von der StlKo Vet und auch international von der WSAVA empfohlen. Er reicht über die Zulassung der S, H und P enthaltenden Nobivac®-Impfstoffe hinaus, die eine Wiederholungsimpfung nach 3 Jahren vorsieht.

B Nobivac® BbPi kann ab einem Alter von 3 Wochen angewendet werden. Eine einmalige Impfung schützt dabei für ein Jahr. Bei einer Vorimpfung mit Nobivac® BbPi kann Nobivac® Respira Bb anschließend 1x jährlich geimpft werden.

IMPFSHEMA 2

Beginn mit Nobivac® Respira Bb

C Nobivac® Respira Bb kann bereits ab einem Alter von 6 Wochen geimpft werden. Eine einfache Impfung 7 Monate nach der Grundimmunisierung mit Nobivac® Respira Bb ist ausreichend, um den Schutz gegen Bb für ein weiteres Jahr aufrecht zu erhalten. Danach sollte die Impfung jährlich erfolgen. Sollte die Auffrischung nach 7 Monaten versäumt werden, ist eine einfache Impfung 12 Monate nach der Grundimmunisierung ausreichend, um den Schutz gegen Bb für ein weiteres Jahr zu verlängern.